

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,  
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю  
с 19.07.2025 г. по 25.07.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт  
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 19.07.2025 г. по 25.07.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. [www.worldometers.info/coronavirus/](http://www.worldometers.info/coronavirus/)
2. [tass.ru/pandemiya-covid-19](http://tass.ru/pandemiya-covid-19)
3. [www.skyscanner.ru/travel-restrictions](http://www.skyscanner.ru/travel-restrictions)
4. [reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001](http://reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001)
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)  
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)  
[boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf](http://boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)

Всего в мире зарегистрировано 787 405 920 случаев заболевания (102 925 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 7 380 случаев (0,8 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 091 307 летальных исходов (927,1 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 119 случаев (0,03 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 4 523 случая, что на 5,1% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 1 392 случая, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 1 465 случаев заболевания, что на 5,5% больше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона**, **Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

### Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается рост уровня заболеваемости на 5,5% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 1 из 35 стран региона – США.

В настоящее время в **США** наблюдается ухудшение эпидситуации по COVID-19. В своем последнем отчете CDC сообщил, что число случаев заболевания в настоящее время растет/вероятно растет по меньшей мере в 26 штатах, а число обращений в отделения неотложной помощи маленьких детей с COVID-19, является высоким. По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что NB.1.8.1, известный как «Нимбус» является доминирующим в США (43% случаев), на втором месте находится LP.8.1 с 31% случаев (рис.3).




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах стабилизируется в масштабах всей страны, в настоящее время показатель оценивается как «низкий» (рис.4).




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

В региональном масштабе эпидситуация несколько отличается. Уровень вирусной активности является высоким во Флориде, Алабаме и на Аляске.

### Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа зарегистрированных случаев заболевания на 10% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован 1 из 56 стран региона – в Великобритании.

По данным Национального отчета по надзору за гриппом и COVID-19 Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA), в **Великобритании** наблюдается незначительное ухудшение эпидситуации с COVID-19. На анализируемой неделе среди всех протестированных образцов 6,3% оказались положительными на SARS-CoV-2 (рис. 6). В секвенированных образцах наиболее распространенным является геновариант XFG (около 60% случаев заражения), также известный как «Stratus».




Рис. 6. Положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в Великобритании (скользящее среднее за 7 дней).

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается стабильная эпидситуация с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 0,8 случаев на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Гамбурге (1,4 сл.), самый низкий — в Мекленбурге – Передней Померании (0,4 сл.) (рис. 7). Геновариант ХЕС по-прежнему доминирует в Германии и в настоящее время является причиной около 88% случаев заражения.



| Федеральная земля             | Текущее значение | ± | Развитие более 4 недель |
|-------------------------------|------------------|---|-------------------------|
| Гамбург                       | 1,4              |   | →                       |
| Берлин                        | 1,2              |   | →                       |
| Саксония                      | 1,2              |   | →                       |
| Саксония-Анхальт              | 1,2              |   | →                       |
| Саар                          | 1,1              |   | ↗                       |
| Баварию                       | 1,0              |   | ↗                       |
| Бранденбург                   | 1,0              |   | →                       |
| Шлезвиг-Гольштейн             | 0,9              |   | ↘                       |
| Германия                      | 0,8              |   | →                       |
| Гессена                       | 0,8              |   | ↗                       |
| Нижняя Саксония               | 0,7              |   | →                       |
| Северный Рейн-Вестфалия       | 0,7              |   | →                       |
| Рейнланд-Пфальц               | 0,7              |   | →                       |
| Баден-Вюртемберг              | 0,6              |   | ↗                       |
| Бремен                        | 0,6              |   | ↘                       |
| Тюрингия                      | 0,5              |   | ↗                       |
| Мекленбург-Передняя Померания | 0,4              |   | ↗                       |

Рис.7. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

По информации ВОЗ, общедоступные данные мониторинга сточных вод из стран Европейского региона остаются низкими и в настоящее время не указывают на какую-либо тенденцию к росту активности SARS-CoV-2 по состоянию на 24 июля 2025 года.

### Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 5,1% в сравнении с прошлой неделей (рис.8).






Рис. 8. – Динамика регистрации новых случаев  
в Западно-Тихоокеанском регионе

Согласно обновленному бюллетеню ВОЗ на текущей неделе в FluNet был отправлен в общей сложности 2841 образец, протестированный на SARS-CoV-2, из 6 стран Западно-Тихоокеанского региона – Японии, Австралии, Индонезии, Республики Корея, Лаоса и Сингапура. Уровень положительных результатов тестов составил 6,7%.

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в одной стране региона - **Японии**. С середины июля в стране наблюдается тенденция к росту числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19, зарегистрированных в надзорных пунктах по всей стране: на анализируемой неделе зарегистрировано 616 новых госпитализаций по сравнению с 485 на предыдущей неделе (рис. 9).




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В **Австралии** третью неделю подряд снижается число случаев заболевания COVID-19 (рис.10). В штате Новый Южный Уэльс за последнюю неделю количество случаев COVID-19 сократилось на 21,1%, в штате Виктория – на 21,9%.




Рис. 10. Динамика заболеваемости COVID-19 в Австралии (январь 2024 г. – июль 2025 г.)

По состоянию на 16 июля 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: B.1.1.529 — 36,4%, NB.1.8.1— 50%, JN.1 — 3,6%, XEC — 2,7%, KP3.1.1 — 4,1% и LP.8.1 — 3,2% (рис.11).




Рис. 11. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, доля геноварианта XFG за последние две недели выросла во всех трех вышеупомянутых регионах: с 1,6% до 6% в Западно-Тихоокеанском, с 7,8% до 26,5% в Американском, с 10,6% до 16,7% в Европейском регионе.

## Юго-Восточная Азия

Согласно данным Министерства здравоохранения **Индии**, по состоянию на 25.07.2025 г. в стране фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. В настоящее время зарегистрировано 359 активных случаев заболевания, большинство из них – в штате Гуджарат (42). Доля положительных результатов тестов на COVID-19 в стране составляет 8,3%. В Индии доминируют геноварианты JN.1.4, XFG, JN.1 и NB.1.8.1.

По данным ВОЗ, в регионе Юго-Восточной Азии данные эпиднадзора за COVID-19 представлены 8 странами в 2025 году. С конца мая по конец июня уровень положительных результатов тестов увеличился с 0,5% до 5% (рис.12).




Рис. 12. Процент положительных тестов на SARS-CoV-2 в странах Юго-Восточной Азии в 2024 г. (синий график) и 2025 г. (желтый график).

### **Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ (последний отчёт – 28.05.2025 г.)**

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15% (рис.13). По всему региону сообщения об увеличении числа случаев заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в

отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19 крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.




Рис. 13. Процент положительных тестов на SARS-CoV-2 в странах Восточно-Средиземноморского региона в 2024 г. (синий график) и 2025 г. (желтый график).

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.